

Nur zur Information des behandelnden Arztes.
Weitergabe nicht statthaft

Poliklinik
Ärztlicher Direktor Prof. Dr. A. J. Falgatter

Tel. 07071 29 82311
FAX 07071 29 4141
e-mail: ukpp@uni-tuebingen.de

Tübingen, den 21.12.2015

AZ: Eberle/ Eberle

Tel: 07071 29 82311


Attestation medicale pour Mme. Yahya Mahamne Jamilla (29.12.1978)

Mme. Y. souffre depuis début 2010 d'une psychose paranoïaque accompagnée de peurs illusionnelles et d'éléments hallucinatoires. Première hospitalisation à Regensburg pendant trois jours et thérapie avec Olanzapine 15 mg. Au court d'un séjour au Niger changement de substance, traitement avec Haloperidol et Trihexyphenidyl.

En octobre 2010 premier contact avec notre service ambulatoire à cause de peurs illusionnelles, troubles du sommeil, fatigue et troubles de l'humeur. Changement de traitement, début d'une thérapie avec Risperidon jusqu'à 6 mg et Mirtazapine 15 mg. Jusqu'à mars 2011 contact régulier avec notre service, amélioration de l'état psychique et arrêt du traitement en 2011.

En juin 2012 nouvelle bouffée délirante et reprise du traitement avec Risperidone jusqu'à 4 mg. Jusqu'à décembre 2012 avec deux crises, contact régulier avec notre service. A cause d'un souhait de grossesse en juillet 2012 changement de traitement, d'abord avec Haloperidol à cause d'effets secondaires, tentative avec Olanzapine et stabilisation de l'état psychique. En octobre 2012 arrêt de la médication contre avis médical. Contact avec notre service de nouveau en Avril 2013 après arrêt de la médication à cause de prise de poids et fatigue, à nouveau problèmes de concentration, peurs. Début d'un traitement avec Aripiprazol 10 mg et Quetiapine 25 mg et stabilisation de l'état psychique. Pendant un séjour en France en octobre 2013, arrêt de la médication avec en août 2014 une nouvelle bouffée délirante et stabilisation sous Aripiprazol 15 mg jusqu'en février 2015. Sous Aripiprazol 10 mg en juin 2015 à nouveaux peurs, éléments hallucinatoires avec augmentation de la dose jusqu'à 15 mg. Remission jusqu'en août 2015, stabilité jusqu'en décembre 2015 avec séjour de 6 semaines en Mozambique.

En conclusion, bouffées délirantes en phases de stress (examens, changement de poste, déménagement du mari en Mozambique, perte de poste) ou après l'arrêt de la medication. Nous conseillons par conséquent un traitement neuroleptique permanent pour garantir la stabilité psychique de la patiente.



Dr. M-Chr. Eberle

Hr. Dr. Mark Christian Eberle

Hochschulambulanz

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie mit Poliklinik

Calwerstraße 14 • 72076 Tübingen

Tel.: 0 70 71 / 29-8 23 02